

빠른 속쓰림 완화

파미딘[®]플러스정

일반약품

파도틴, 산화하이드로콜린, 황민산칼슘

제품정보 QR코드

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고서, 약과 함께 보관하십시오.

【원료약품의 분량】 1정(1,230mg) 중 유효성분:

파도틴(USP)10mg, 수산화마그네슘(KP)165mg, 침강탄산칼슘(KP)800mg, 첨가제(타르색소) : 청색1호, 청색2호, 황색203호, 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 오파드라이녹색(03B41083), 유당수화물, 옥수수전분, 저저항도히도록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성인산화규소

【성상】 연두색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다 및 속쓰림과 관련된 가슴앓이의 증상

【용법·용량】 성인과 만 15세 이상은 한자 : 1회 1정을 복용합니다. 24시간 안에 2정을 초과하여 복용하지 마십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 파도틴-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 2) 이 성분 및 다른 H2 수용체 길항제에 과민증이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 3) 복용에 어려움을 느낀다면 사용하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 원인 불명의 체중 감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 2) 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 3) 신장 질환자 : 혈중 칼슘 농도를 측정하십시오.
- 4) 다른 약제를 복용중인 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오. 제산제는 다른 처방약들과 상호작용을 일으킬 수 있습니다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 드물게 아나필락시스 반응이 나타날 수 있습니다.
- 2) 간장 : 드물게 효소 이상이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기 : 때때로 구역과 설사가 나타날 수 있고, 드물게 변비, 식욕부진, 복부불쾌감, 고창, 구토, 구갈 등이 나타나는 경우가 있습니다.
- 4) 피부 : 드물게 발진, 가려움증, 덩마진이 나타날 수 있고, 예외적으로 다른 히스타민-H2길항제와 마찬가지로 표피박리가 나타날 수 있습니다.
- 5) 기타 : 때때로 두통이 나타날 수 있고, 드물게 피로, 황달, 간염, 맥관신경증성 부종, 관절통, 근육경련 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

제조회사의 :



충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
 구입처론 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부서 작성일자(2022.10.19)이후 변경된 내용은 중근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인하실 수 있습니다.

- 1) 2주간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2) 2주간을 초과하여 연용하지 마십시오.
- 3) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산염소 효능 손실 위험이 발생할 수 있습니다.

5. 상호작용

- 1) 본제에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용을 일으킬 수 있습니다.
 - 이테놀산, 메토프로롤, 프로프라놀롤, 클로르젠, 싸이클린계 항생제, 디클루니살, 디곡신, 이인산 염, 맥소펜나민, 철(염), 플루오로퀴놀론계 항생제, 불화나트륨, 글루코코르티코이드, 인도메타신, 케토코나졸, 란소프라졸, 페니치아민계 항진균제, 페니실라민, 인산염, 티록신(약물의 소화 흡수 감소) 등과 병용시에는 가능한한 2시간 이상의 간격을 두고 투여합니다.
 - 살리실산 : 노의 알칼리화로 살리실산의 신 배설이 증가됩니다.
- 2) 본제를 다른 위장약과 병용하지 마십시오 : 본제를 다른 위장약과 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 투여 : 동물 실험에서 수산화마그네슘의 사용과 기형과의 연구는 실시되지 않았고, 파도틴 투여의 사용으로 기형이 유발되었다는 보고는 없었습니다. 과량 투여와 탄산 칼슘의 연용으로 골화이상 이 보고되었고, 이 성분에 계속 노출된 임신부에 있어서 모든 위험을 배제하지는 못하므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 투여하지 않는 것이 좋습니다.
- 2) 수유부에 대한 투여 : 히스타민-H2길항제는 모유중으로 이행됩니다. 수유부를 통하여 소아가 섭취하는 약 물량은 약 1% 정도로 낮고, 약동학적 자료들은 이를 뒷받침합니다. 그러나 수유부의 복용과 관련된 소아의 내성은 장기치료와 복용량이 증가하는 경우에 대해서는 알려지지 않았으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 좋습니다.

7. 소아에 대한 투여

15세 미만의 소아에게 투여 시 의사와 상의 하십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선이나, 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고, 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타제품과의 혼합 및 혼용(용이 섞이) 되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- 3) 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

【저장방법】 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

【포장단위】 10정/상자(10정/PTPx1)

구입시 유효기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수약품) 제2 및 품질관리기준(저격업) 제품 ®-등록상표 103

제조사 : (주)인티브라이오파마
 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12, 104-2 1동 1층(일부) 및 2층(일부)(보관소) (PTP 포장 외 전공정)

제조사 : (주)한국피부스제약
 경기도 안산시 단원구 신단로83번길 127 (PTP포장)